

レジメン名

CBDCA+VP-16

出典 British Journal of Cancer(2007)97,162-169
Annals of Oncology 24: 152-160, 2013

実施部署区分

<input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
--	-----------------------------	-----------------------------

対象疾患

NET G3またはNEC
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

投与減量の基準

WBC	1000/mm ³ 未満	PLT	2.5万/mm ³ 未満
ANC	500/mm ³ 未満		
その他	WBCもしくはANCもしくはPLTの値が4日間以上上記の値で続いたとき、次のクールでCBDCAはAUC4(GFR+25)、VP-16は60mg/m ² とする。減量後も上記値が続く場合は投与中止とする。		

投与中止の基準

WBC	3000/mm ³ 未満	PLT	7.5万/mm ³ 未満
Cr	1.5mg/dL以上		
AST/ALT	100IU/L以上		
その他			

1クール期間 21-28日

総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
エトポシド	80mg/m ²	輸液500mL	120分	d1-3
カルボプラチン	AUC5(GFR+25)	5%TZ250mL	90分	d1
カルボプラチンの投与量計算に用いるGFRはCockcroft-GaultとeGFR×BSA/(1.73×0.715)のうち低い値を採用。安定性の観点から、カルボプラチンの希釈液は5%TZを基本とする。				

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1 ①グラニセロン3mgハック+デキサート6.6mg (15-30min) ②エトポシド80mg/m ² +輸液500mL(2hr) DEHPフリーの点滴セットを用いて投与 ③CBDCA+5%糖液250mL(90min) ④生食50mL フラッシュ用 day2-3 ①デキサート6.6mg+生食50mL(15-30min) ②エトポシド80mg/m ² +輸液500mL(2hr) DEHPフリーの点滴セットを用いて投与 ③生食50mL フラッシュ用 <内服*> day1-3 アプレピタントカプセルセット ※必要に応じて、適宜使用