

レジメン名

Weekly-TC(PTX+CBDCA)

出典 J Clin Oncol 2009;27:1177-1183.
Gynecologic Oncology 114(2009)215-218

実施部署区分

☒ 入院	☒ 外来	☐ 処置
--	--	-----------------------------

対象疾患

卵巣癌
☐ 進行・再発
☐ 補助療法(術前・術後)
☒ Stage I C~IV
☐

投与減量の基準

その他	Grade3,4の血液毒性では25%減量		

1クール期間 21日
(次のクールまでの標準期間)

総クール数 6-8クール

投与中止の基準

ANC	1000/mm ³ 未満	PLT	7.5万/mm ³ 未満
その他			

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
パクリタキセル	80 mg/m ²	生食250mL	60分	day1,8,15
カルボプラチン	AUC2	5%糖液250mL	60分	day1,8,15

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、溶解液まで含む)
day1,8,15 ①アロキシ0.75mgハック+デキサート9.9 mg+ファモチジン 20 mg+ホラミン5 mg (30分) ②パクリタキセル80 mg/m ² +生食250 mL (60分) ※インラインフィルターを用いて投与 ③カルボプラチンAUC2+5%糖液250 mL (60分) ④生食50mL (全開)