

レジメン名

GEM

出典 誰も教えてくれなかった婦人科がん薬物療法
改訂第2版

実施部署区分

☒入院 ☐外来 ☐処置

対象疾患

卵巣がん

☒進行・再発: プラチナ抵抗性
☐補助療法(術前・術後)
☐
☐

投与減量の基準

ANC	1000/mm ³ 未満	Hb	8.0g/dL未満
Cr	男性3.24mg/dL、女性2.4mg/dLを超える		
AST(GOT)	200IU/Lを超える	ALT(GPT)	225IU/Lを超える
T-bil	3.6mg/dLを超える		
その他	Grade3以上の悪心・嘔吐 Grade2以上の非血液学的毒性(悪心・嘔吐を除く) 上記の場合、800mg/m ² へ減量を考慮		

投与中止の基準

WBC	2000/mm ³ 未満	PLT	7万/mm ³ 未満
ANC	1000/mm ³ 未満	Hb	8.0g/dL未満
Cr	男性3.24mg/dL、女性2.4mg/dLを超える		
AST(GOT)	200IU/Lを超える	ALT(GPT)	225IU/Lを超える
T-bil	3.6mg/dLを超える		
その他	Grade3以上の悪心・嘔吐 Grade2以上の非血液学的毒性(悪心・嘔吐を除く) 間質性肺炎などの揮脱性の発症や急性情悪、過敏症、重症感染症、 心筋梗塞、呼吸困難などのアナフィラキシー、微小管症性貧血の発 現、腎障害		

1クール期間 28日
(次のクールまでの標準期間)

総クール数 PDまで

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%糖液100mL	30分	d1、8、15

1日投与順
(経時的に「プレ Medikation」・「ポスト Medikation」、溶解
液まで含む)

day1、8、15
①「ネキサート」6.6mg＋生食100mL(15min)
②「ゲムシタビン」1000mg/m²＋5%糖液100mL(30min)
③生食50mL(フラッシュ用)