

レジメン名

rituximab

出典      リツキシマブBS点滴静注「ファイザー」添付文書  
2023年9月改訂

実施部署区分

☒入院      ☒外来      ☐処置

対象疾患

慢性特発性血小板減少性紫斑病  
後天性血栓性血小板減少性紫斑病  
☒再発・難治  
☐補助療法(術前・術後)  
☐初発  
☐

投与減量の基準

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

1クール期間      7日      総クール数      4クール  
(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

| 薬剤名・略号                                                                                                                                                           | 1日投与量                | 投与方法                  | 投与速度<br>(時間)             | 投与日(d1、d8等) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| リツキシマブ                                                                                                                                                           | 375mg/m <sup>2</sup> | 輸液<br>1~4mg/mLに<br>希釈 | 初回は<br>50mg/hr<br>から漸増※1 | d1          |
| ※1 初回リツキシマブの投与速度は50mg/hrで開始し、問題なければ30分毎に50mg/hrずつ上げて、400mg/hrまで上げることができる。<br>2回目以降、初回投与時に副作用が軽微であった場合、2回目以降は100mg/hrで開始し、30分毎に100mg/hrずつ上げて、400mg/hrまで上げることができる。 |                      |                       |                          |             |
|                                                                                                                                                                  |                      |                       |                          |             |
|                                                                                                                                                                  |                      |                       |                          |             |
|                                                                                                                                                                  |                      |                       |                          |             |
|                                                                                                                                                                  |                      |                       |                          |             |
|                                                                                                                                                                  |                      |                       |                          |             |
|                                                                                                                                                                  |                      |                       |                          |             |

| 1日投与順<br>(経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、<br>溶解液まで含む)                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| day1<br>①ソル・コーテフ200mg＋ポララミン5mg＋生食50mL(15~30min)<br>②リツキシマブ375mg/m <sup>2</sup> ＋生食適量(50mg/hrから漸増※1)<br>③生食50mL(フラッシュ用) |