

レジメン名

Nivolumab(q2w)

出典 オブジーボ適正使用ガイド単剤療法版2021年12月作成
NM-K2002試験

実施部署区分

入院
 外来
 処置

対象疾患

原発不明癌
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 「原発不明がん診療ガイドライン」(日本臨床腫瘍学会)に基づき、適切な全身検査及び病理学的検査を実施した上で、原発臓器が不明な上皮性悪性腫瘍と診断され、かつ、腫瘍の局在・組織型等に基づいて推奨される治療法のない患者

投与減量の基準

その他			

投与中止の基準

AST	120IU/Lを超える	ALT	120IU/Lを超える
T-bil	1.8mg/dLを超える		
Cr	6.48(女性は4.8)mg/dLを超えるかつベースライン値の1.5倍超		
その他	Grade1以上の肺炎、Grade2以上の下痢・大腸炎・神経毒性・心筋炎、Grade3以上の発疹、症候性の甲状腺機能低下症・甲状腺中毒・下垂体障害・副腎障害、1型糖尿病、副腎クリーゼの疑い		

1クール期間 14日

総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
ニボルマブ(オブジーボ)	240mg/body	輸液100mL	30分	day1

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1 ①生食50mL(ルート確保用) ②オブジーボ240mg/body+輸液100mL インラインフィルターを用いて投与 (30分) ③生食50mL(フラッシュ用)