

レジメン名

weekly CDDP (CCRT)

出典 NEJM 2004;350:1937-44.
NEJM 2004;350:1945-52.
NEJM 2003;349:2091-8.

実施部署区分

☒入院 ☐外来 ☐処置

対象疾患

頭頸部がん

■根治的
局所進行切除不能、咽頭温存希望
■術後補助
再発高リスク、局所進行性

投与減量の基準

CCr	40mL/min以上50mL/min以下	CDDP:25%減量
その他	下記の場合、CDDPを40%減量 神経毒性の出現	

投与中止の基準(シスプラチン)

ANC	1000/mm ³ 未満	PLT	7.5万/mm ³ 未満
CCr	40mL/min未満		
その他			

1クール期間 7日

総クール数 6-7
コース

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
【化学放射線療法】				
シスプラチン	40mg/m ² ※	生食 計500mL	60分	d1※
放射線照射	2Gy/日	根治的：合計66～70Gy 術後：50～66Gy		d1- 週5回
※出典では、シスプラチン100mg/m ² をd1・22・43に投与。				

1日投与順
(経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、
溶解液まで含む)

<内服>
day1-3
アブレタントカプセル(125-80-80)
day1は化学療法開始1時間前、day2,3は朝食後
day1-4
オランザピン5mg 夕食後
(糖尿病は禁忌、高齢者は2.5mgへ減量を考慮する
など慎重に投与)
<DIV>
day1
①ソルデム1 500mL/120min
②ソルデム3A 500mL+硫酸マグネシウム
20mL/120min
③パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg+デキ
サート9.9mg/15min
④マンニット(500)250mL/30min
⑤シスプラチン40mg/m²+生食 計500mL/60min
⑥ソルデム1 500mL/60min
⑦ソルデム1 500mL/60min
⑧ソルデム1 500mL/60min
⑨ソルデム3A 500mL/60min

day2-3
①デキサート6.6mg+NS 50mL/15min
②ソルデム1 500mL/120min
③ソルデム1 500mL/120min
④ソルデム3A 500mL/120min

day4
①デキサート6.6mg+NS 50mL/15min