

レジメン名

weekly PTX

出典 TS-1適正使用ガイド2012年10月改訂

実施部署区分

■入院 ■外来 □処置

対象疾患

胃がん
■進行・再発
□補助療法(術前・術後)
□
□

投与減量の基準

Table with 4 columns and 3 rows for dosage reduction criteria, including a 'その他' (Other) row.

投与中止の基準

Table with 4 columns and 2 rows for discontinuation criteria, including WBC, ANC, AST(GOT), ALT(GPT), and Hb levels.

※出典ではPit 10万/mm3、ANC 2000/mm3だが、制限が厳しいため上記の値で登録

1クール期間 28日

総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)

Main table with 5 columns: 薬剤名・略号, 1日投与量, 投与方法, 投与速度(時間), 投与日(d1, d8等). Row 1: パクリタキセル, 80mg/m2, NS250mL, 60分, d1, 8, 15.

Table with 1 column and 2 rows: 1日投与順 (経時的にプレメタキソン・ホストメタキソン、溶解液まで含む). Row 1: day1, 8, 15. Row 2: ①ファモチジン20mg+デキササート6.6mg+ポラミン5mg+生食100(30min) ②パクリタキセル80mg/m2+生食250mL(60min) DEHPフリーのインラインフィルターを用いて投与 ③生食50mL(フラッシュ用)